

# Fresubin® Protein POWDER



## Nährwertabelle

Typanalyse		pro 100 g	pro 5 g = 1 Messlöffel
<b>Energiewert</b>	kcal (kJ)	360 (1500)	18 (75)
<b>Fett (2 %E)</b>	g	1.0	0.05
davon gesättigte Fettsäuren	g	< 0.07	< 0.004
davon einfach ungesättigte Fettsäuren	g	0	0
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren	g	0	0
<b>Kohlenhydrate (≤ 1 %E)</b>	g	≤ 1.0	≤ 0.05
davon Zucker	g	≤ 1.0	≤ 0.05
davon Laktose	g	≤ 1.0	≤ 0.05
<b>Nahrungsfasern (0 %E)</b>	g	0	0
<b>Protein (97 %E)</b>	g	87	4.4
<b>Salz</b>	g	1.38	0.07
<b>Wasser</b>	ml	≤ 5.5	≤ 0.3
<b>Osmolarität</b>	mosmol/l	n. m.	n. m.
<b>Mineralstoffe und Spurenelemente</b>			
Natrium	mg/mmol	550 23.9	27.5 1.2
Kalium	mg/mmol	1200 30.7	60 1.5
Chlorid	mg/mmol	0 0	0 0
Calcium	mg/mmol	60 1.5	3 0.07
Magnesium	mg/mmol	0 0	0 0
Phosphor	mg/mmol	240 7.7	12 0.4
Vitamine und andere Mikronährstoffe sind in klinisch nicht relevanten Mengen enthalten.			
%E = Energieanteil n.m. = nicht messbar			

## Produktinformationen

### Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)

Ergänzende bilanzierte Diät mit Molkenprotein. Glutenfrei, ohne Nahrungsfasern. Zum Diätmanagement bei Patienten mit drohender oder bestehender Mangelernährung, speziell für Patienten mit erhöhtem Eiweissbedarf.

### Dosierungsempfehlungen

Zur ergänzenden Ernährung 2 - 3 Messlöffel (= 10 - 15 g) 2 - 3 Mal (= 20 - 45 g) täglich oder nach ärztlicher Empfehlung.

### Wichtige Hinweise

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschliesslichen Ernährung geeignet. Die Kalium (K) Spiegel bei Patienten unter einer kaliumreduzierten Diät überwachen. Nicht geeignet für Kinder < 1 Jahr. Bei Kindern < 6 Jahren mit Vorsicht verwenden. Nicht geeignet bei Galaktosämie.

### Gegenanzeigen

Krankheitszustände mit grundsätzlichem Verbot zur enteralen Ernährung (Magen-, Darmatonie, Ileus). Schwere organspezifische Störungen (Leber-, Niereninsuffizienz, schwere Formen der Maldigestion und -absorption). Angeborene Stoffwechselstörungen gegen die in Fresubin® Protein POWDER enthaltenen Nährstoffe.

### Lagerung

Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Nach Gebrauch wieder verschliessen. Geöffnete Dosen innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen.

### Zubereitung und Dosierung in heissen Speisen/Getränken von über 70 °C (nicht kochend)

2 - 3 Messlöffel (10 - 15 g) in 25 - 50 ml Flüssigkeit bei Raumtemperatur auflösen. Die Mischung in 150 ml warme Flüssigkeit oder in 150 g der Speise kurz vor dem Servieren einrühren (max. 10 Minuten vor dem Servieren). Während/nach der Zugabe von Fresubin® Protein POWDER darf die Flüssigkeit/Speise nicht mehr kochen.

### Zubereitung in kalten oder warmen Flüssigkeiten/Speisen (max. 70 °C)

2 - 3 Messlöffel (10 - 15 g) direkt in 150 ml Flüssigkeit oder 150 g Speise einrühren.

## Zutaten

### Fresubin® Protein POWDER

Molkenprotein, Emulgator (Sojalecithin)

## Bestellinformationen

	Artikel-Nr.	Pharmacode
Dose (1 x 300 g)	7951401	5013591
Sachets (40 x 11.5 g)	7958401	6030410



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG  
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens  
www.fresenius-kabi.ch

Telefon 041 552 70 00  
InfoLine 0800 800 877  
InfoMail@fresenius-kabi.com