Fresubin®
Protein POWDER

Valeurs nutritives

Composition		pro 100 g	pour 5 g = 1 mesurette
Valeur énergétique	kcal (kJ)	360 (1500)	18 (75)
Lipides (2 %E)	g	1.0	0.05
dont acides gras saturés	g	< 0.07	< 0.004
dont acides gras monoinsaturés	g	0	0
dont acides gras polyinsaturés	g	0	0
Glucides (≤ 1 %E)	g	≤ 1.0	≤ 0.05
dont sucres	g	≤ 1.0	≤ 0.05
dont lactose	g	≤ 1.0	≤ 0.05
Fibres (0 %E)	g	0	0
Protéines (97 %E)	g	87	4.4
Sel	g	1.38	0.07
Eau	ml	≤ 5.5	≤ 0.3
Osmolarité	mosmol/l	n. m.	n. m.
Sels minéraux et oligoéléments			
Sodium	mg/mmol	550 | 23.9	27.5 | 1.2
Potassium	mg/mmol	1200 | 30.7	60 | 1.5
Chlore	mg/mmol	0 | 0	0 | 0
Calcium	mg/mmol	60 | 1.5	3 | 0.07
Magnésium	mg/mmol	0 | 0	0 | 0
Phosphore	mg/mmol	240 | 7.7	12 | 0.4

Des vitamines et d'autres micronutriments sont présents dans des quantités cliniquement non pertinentes.

%E = part d'énergie
n.m. = non mesurable

Informations de produit

Dennrée alimentaire destinée à de fins médicales spéciales.
Poudre instantanée à base de protéines de lactosérum. Sans gluten, sans fibres. Pour les besoins nutritionnels des patients dénutris ou à risque de dénutrition plus particulièrement en cas de besoins protéiques accrus et/ou en cas d'apport protéique diminué.

Dosage
Les quantités doivent être déterminées et adaptées par le professionnel de santé selon les besoins du patient. En complément de l'alimentation, 10 à 15 g, 2 à 3 fois (20 – 45 g) par jour.

Avis important
A utiliser sous contrôle médical. Ne pas utiliser comme seule source d'alimentation. Tenir compte de l'apport en potassium et surveiller la kaliémie des patients nécessitant un régime restrictif en potassium. Ne convient pas à l'enfant de moins de 1 an. Utiliser avec précaution chez l'enfant de moins de 6 ans. La prescription est à adapter pour un usage pédiatrique. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie.

Gegenanzeigen
Affections interdisant absolument toute alimentation entérale (atonie gastro-intestinale, iléus). Troubles organiques graves (insuffisance hépatique ou rénale) ou formes sévères de maldigestion ou malabsorption. Troubles congénitaux du métabolisme des nutriments contenus dans Fresubin® Protein POWDER.

Conseils d'utilisation
Stocker dans un endroit sec à température ambiante. Après ouverture de la boite, bien refermer et utlisier dans 2 mois.

Pour une utilisation dans les préparations chaudes > 70 °C, sans porter à ébullition
Diluer 2 à 3 cuillères mesure (10 à 15 g) dans une petite quantité de liquide (25 à 50 ml) à température ambiante. Ajouter ce mélange à 150 ml de liquide chaud ou à 150 g de préparation chaude 10 minutes maximum avant de servir. La préparation ne doit pas être réchauffée pendant ou après l'incorporation de la poudre. Fresubin® Protein POWDER n'est pas adapté pour être porté à ébullition.

Pour une utilisation dans les liquides ou les préparations à une température , < 70 °C
Ajouter directement 2 à 3 cuillères mesure (10 à 15 g) dans 150 ml de liquide ou 150 g de préparation.

Ingrédients

Fresubin® Protein POWDER
Protéines de lactosérum, émulsifiant (lécithine de soja)

Informations de commande

		N° d'art.	Pharmacode
Boîte	(1 x 300 g)	7951401	5013591
Sachets	(40 x 11.5 g)	7958401	6030410

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch

Téléphone 041 552 70 00
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

EN-2021-107/3-f