



Fresubin[®] Protein POWDER

Aggiunge energia a cibi e bevande

Polvere istantanea dal gusto neutro a base di proteine del siero di latte, per arricchire le bevande e i cibi, dolci o salati, caldi e freddi, ad esempio succhi, derivati del latte, pure, passati di frutta, minestre. In caso di aumentato fabbisogno proteico o di ridotto apporto proteico.

A base di proteine del siero di latte di elevata qualità

Fonte proteica concentrata
87 g di proteine/100 g di polvere

Buona solubilità in cibi e bevande

Fresubin® Protein POWDER



Valori nutrizionali

Composizione		per 100 g	per 5 g = 1 misurino
Valore energetico	kcal (kJ)	360 (1500)	18 (75)
Grassi (2 %E)	g	1.0	0.05
di cui acidi grassi saturi	g	< 0.07	< 0.004
di cui acidi grassi monoinsaturi	g	0	0
di cui acidi grassi polinsaturi	g	0	0
Carboidrati (≤1 %E)	g	≤1.0	≤0.05
di cui zuccheri	g	≤1.0	≤0.05
di cui lattosio	g	≤1.0	≤0.05
Fibre alimentari (0 %E)	g	0	0
Proteine (97 %E)	g	87	4.4
Sale	g	1.38	0.07
Acqua	ml	≤ 5.5	≤ 0.3
Osmolarità	mosmol/l	n. m.	n. m.
Sostanze minerali e oligoelementi			
Sodio	mg/mmol	550 23.9	27.5 1.2
Potassio	mg/mmol	1200 30.7	60 1.5
Cloro	mg/mmol	0 0	0 0
Calcio	mg/mmol	60 1.5	3 0.07
Magnesio	mg/mmol	0 0	0 0
Fosforo	mg/mmol	240 7.7	12 0.4
Vitamine e altri micronutrienti sono contenuti in quantità clinicamente non rilevanti.			
%E = parte di energia n.m. = non misurabile			

Informazioni sul prodotto

Alimento a fini medici speciali

Dieta integrativa bilanciata a base di proteine del siero di latte. Senza glutine, senza fibre alimentari. Per la gestione dietetica nei pazienti con minaccia o presenza di malnutrizione, in particolare nei pazienti con aumentato fabbisogno proteico.

Raccomandazioni posologiche

Per integrare l'alimentazione, 2 - 3 misurini (= 10 - 15 g) 2 - 3 volte (= 20 - 45 g) al giorno o come raccomandato dal medico.

Avvertenze importanti

Utilizzare solo sotto il controllo medico. Non indicato per la dieta esclusiva. Monitorare i livelli di potassio (K) nei pazienti che seguono una dieta povera di potassio. Non indicato nei bambini < 1 anno. Utilizzare con prudenza nei bambini < 6 anni. Non indicato nella galattosemia.

Controindicazioni

Condizioni patologiche con divieto sostanziale di alimentazione enterale (atonía gastrointestinale, ileo). Severi disturbi organo-specifici (insufficienza epatica, renale, severe forme di maldigestione e malassorbimento). Disturbi metabolici ereditari riguardanti gli alimenti contenuti in Fresubin® Protein POWDER.

Conservazione

Conservare all'asciutto e a temperatura ambiente. Richiudere dopo l'uso. Una volta aperto, il barattolo va utilizzato entro 2 mesi.

Preparazione e dosaggio in bevande e cibi molto caldi, sopra i 70 °C (non bollenti)

Sciogliere 2 - 3 misurini (10 - 15 g) in 25 - 50 ml di liquido a temperatura ambiente. Versare la miscela in 150 ml di liquido caldo o in 150 g di cibo poco prima di servire (massimo 10 minuti prima di servire). Durante e dopo l'aggiunta di Fresubin® Protein POWDER, il liquido o il cibo non può più essere portato a bollitura.

Preparazione in liquidi o cibi freddi o caldi (massimo 70 °C)

Mescolare 2 - 3 misurini (10 - 15 g) direttamente in 150 ml di liquido o in 150 g di cibo.

Ingredienti

Fresubin® Protein POWDER

Proteine del siero di latte, emulsionante (lecitina di soia)

Informazioni per l'ordinazione

	Cod. art.	Pharmacode
Barattolo (1 x 300 g)	7951401	5013591
Bustine (40 x 11.5 g)	7958401	6030410