Supportan®
加力康™

陪你跨越 抗頑症之路
重現生活色彩

醫學研究顯示

醫學實證
連續飲用[9]
7星期

每日2支**加力康**™癌症專用營養品，提供一切所需，達到理想成效。

▲每日2支加力康™，每支200毫升

3個階段的營養補給，陪你跨越抗頑症之路

治療前*（準備期）

每天飲用
2支加力康™
（3款味道以供選擇）

確診後，可開始飲用**加力康**™，增加蛋白質及熱量攝取，為療程作好準備。

治療期，每日飲用2支**加力康**™，EPA有助舒緩電療或化療的副作用；補充手術前後額外蛋白質的需求。更有助維持體重及抵抗力；完成療程。[6]

治療期間*（手術及療程期）

配合加力康™飲用
修復營養粉以作傷口癒合支援

建議每日**2-3包修復營養粉**[§]

22.4g x30包（無味）

§≥5日

含大量醯胺（Glutamine）、抗氧化維他命及微量原素

治療後（康復期）

康復期間，繼續飲用**加力康**™或**倍力康**™全效均衡營養產品作補充，有齊你所需的碳水化合物、蛋白質，脂肪，多種維他命、礦物質及微量原素。

或

*建議治療前及治療期間連續7星期每日飲用2支加力康™，補充EPA[9,10]

www.caringforlife.hk
營養諮詢：(852) 2176 1912

銷售地點：
萬寧 mannings | mannings Plus　watsons 屈臣氏
華潤堂 CRCare　HKTV mall.com　各大藥房及復康店

FRESENIUS KABI caring for life
香港灣仔港灣道30號新鴻基中心50樓5001-5027室
電話：(852) 2152 1330　傳真：(852) 2119 0815
網址：www.caringforlife.hk
電郵：infohk@fresenius-kabi.com
澳門代理：康寧藥業有限公司
電話：(853) 2892 2177

HK-DA-204-2020

FRESENIUS KABI caring for life

由確診後開始，
加力康™全面關顧你

每日2支加力康™癌症專用營養品，達到理想成效。

德國研發及製造

歐洲第1醫學營養品

Supportan®
加力康™

Supportan® 加力康™ 癌症專用營養品

符合歐洲腸內外營養學會(ESPEN*)建議[2]。

加力康™癌症專用營養品是唯一低醣高能量高蛋白配方☆，補充癌症病人營養。

低醣高能量

高脂肪/ 低碳水化合物
(佔40%能量) / (佔31%能量)

- ✓ 給予患者適合的熱量來源[4]
- ✓ 豐富不飽和脂肪酸為患者提供足夠熱量[4]
- ✓ 為患者提供能量，而非為腫瘤提供能量[4]

高蛋白

每日2支，提供40克蛋白質^

- ✓ 維持抵抗力、有助修復組織、彌補蛋白質消耗及抗衡肌肉流失[6]

含有EPA

每日提供2克EPA^,△

- ✓ 能減少療程會引起的副作用[5]
- ✓ 可增加T細胞數目，改善癌症患者的免疫能力[3]
- ✓ 改善癌症患者的營養情況[3]

含有抗氧化維生素

含有足夠的抗氧化維生素

- ✓ 有助傷口癒合，減低出現感染性併發症[7]

- **中鏈脂肪酸 (MCT#)**
  可以快速溶於水中，更易被身體吸收，並提供能量[8]
- **益菌生纖維 (prebiotic fibre)**
  屬於水溶性纖維，有助軟化大便，促進腸道健康[6]
- **不含乳糖 (lactose)**
  避免乳糖不耐症引起的腹瀉

即飲裝備有多款口味，
方便飲用，更能提升食慾。

癌症與營養不良

癌細胞於代謝過程中，誘發身體出現炎症反應及分泌大量有害物質，令患者感食慾不振及體重下降，長期可能導致肌肉流失，以致傷口難以癒合，增加細菌感染風險，這情況是由癌症引起的惡病質(Cancer Cachexia)[11]。

癌症惡病質3階段[12]

惡病質演變分3階段，初期症狀不明顯，一旦發生便難逆轉。

正常	惡病質前期	惡病質	難治型惡病質
評估依據	• 體重減輕幅度 ≤5%	• 6個月內體重減輕幅度≥5% • BMI≤20，且體重減輕幅度≥2%	• 嚴重肌肉耗損 • 脂肪流失 • 代謝不正常 • 體力下降
引發症狀	• 厭食 • 新陳代謝異常	• 食物攝取減少 • 肌少症 • 全身性炎症反應	• 預期壽命不超過3個月

癌症患者亦因療程引致的副作用，如噁心、嘔吐等，導致食量大減而進一步導致體重下降及營養不良[15]。根據統計，視乎癌症種類，30-85%的癌症病人有體重下降，例如：食道癌80%、頭頸癌70%、大腸癌60%[3]。體重下降的原因包括：

- **食慾大減[1]**
- **吸收不良[3]**
- **能量需求增加[3]**
- **代謝改變[3]**

勿輕視營養不良

癌症患者不要小看體重下降及營養不良，體重只要下降6%，便會大大影響治療效果及存活率[15]。體重下降亦會令抵抗力下降[3]。

適當攝取營養，增加抗頑勝算

攝取充足營養對治療非常重要，有助：

- 預防及處理營養不良及癌症惡病質[3]
- 維持體重[6]
- 改善生活質素[3]
- 控制癌症治療的副作用[5]
- 幫助病人完成整個癌症療程[5]

營養中加入魚油對癌症治療的幫助

醫學研究顯示，癌症患者每天攝取2克EPA魚油，有助對抗癌症惡病質引致的炎症反應、抑制有害物質產生及減低治療引起的副作用，助你按時完成療程[5]。

參考資料：1. Cooper C, et al. Understanding and managing cancer-related weight loss and anorexia: insights from a systematic review of qualitative research. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. 2015; 6:99–111. 2. Arends J, et al. EESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical Nutrition. 2017; 36: 11-48. 3. Argile´s JM. Cancer- associated malnutrition. Eur J Oncol Nurs. 2005; 9: S39–S50. 4. Rossi- Fanelli F, et al. Abnormal substrate metabolism and nutritional strategies in cancer management. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 1991; 15: 680-683. 5. MacDonald N, et al. Understanding and Managing Cancer Cachexia. J Am Coll Surg. 2003; 1: 143-161. 6. Benefits of good nutrition during cancer treatment. American Cancer Society website (assessed on May 7, 2019): https://www.cancer.org/treatment/survivorship-during-and-after-treatment/staying-active/nutrition/nutrition- during-treatment/benefits.html. 7. Chow O, et al. Immunonutrition: Role in Wound Healing and Tissue Regeneration. Advances in Wound Care. 2014;3: 46-53. 8. Nagao K et al. Medium-chain fatty acids: Functional lipids for the prevention and treatment of the metabolic syndrome. Pharmacological Research. 2010; 61:208–212. 9. Barber MD et al. The effect of an oral nutritional supplement enriched with fish oil on weight- loss in patients with pancreatic cancer. British Journal of Cancer. 1999: 81(1): 80-86. 10. Colomer R, et al. n-3 Fatty acids, cancer and cachexia: a systematic review of the literature. British Journal of Nutrition. (2007); 97: 823–831. 11. Bruggeman AR, et al. Cancer Cachexia: Beyond Weight Loss. Journal of Oncology Practice, 2016; 12(11): 1163-1172. 12. Fearon K, et al. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncol 2011; 12: 489–95. 13. Giacosa A, et al. Fish oil and treatment of cancer cachexia. Genes Nutr (2008) 3:25–28. 14. Muphy RA, et al. Supplementation With Fish Oil Increases First-Line Chemotherapy Efficacy in Patients With Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer. Cancer 2011;1|17:3774–80. 15. Hager KK. Management of Weight Loss in People With Cancer. J Adv Pract Oncol. 2016; 7: 336–338

*The European Society for Clinical Nutrition & Metabolism ^以每日2支加力康™Supportan計算 △EPA= Eicosapentaenoic Acid #MTC= Medium Chain Triglycerides ☆根據2021年市場調查